



اشتباه در مقدار مصرف لووستیریزین (Levocetirizine)

به اطلاع همکاران محترم می‌رساند، مرکز ADR گزارش‌هایی مبنی بر اشتباه در تحویل قرص لووستیریزین ۵ میلی گرمی به جای قرص ۵ میلی گرمی ستیریزین بدون تنظیم دوز دریافت داشته است. با توجه به تفاوت‌های این دو دارو از نظر مقدار مصرف، توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می‌نماید:

۱. ستیریزین یک آنتی هیستامین راسمیک دارای دو ایزومر چپ گرد (لووستیریزین) و راست گرد (دکستروستیریزین) می‌باشد که اثرات آنتی هیستامینی ستیریزین مربوط به ایزومر لووستیریزین می‌باشد.
۲. از آنجایی که ستیریزین حاوی مقادیر مساوی از هر دو انانتیومر می‌باشد، ۵ میلی گرم لووستیریزین از نظر درمانی معادل ۱۰ میلی گرم ستیریزین می‌باشد لذا در زمان جایگزینی باید این نکته را مدنظر قرار داد.
۳. مجدداً تاکید می‌شود در صورت ارائه یا مصرف لووستیریزین به جای ستیریزین، حتماً به دوز تجویز شده ستیریزین توجه نمایید. در صورتی که مقدار مصرف تجویز شده برای بیمار ۵ میلی گرم ستیریزین در روز باشد، نمی‌توان مقدار ۵ میلی گرم در روز لووستیریزین را به جای آن مصرف نمود.

از همکاران محترم تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هر گونه عارضه یا اشتباه دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرم‌های زرد و ارسال به صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۸۵ و یا از طریق سایت www.fdo.ir، نمابر (۸۸۸۹۰۸۵۷) یا تماس تلفنی (۴-۸۸۹۲۳۱۹۳) به مرکز ADR گزارش نمایند.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی