

فلج برگشت ناپذیر ناشی از آمپول دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام

پیرو اطلاعیه های مکرر قبلی و با توجه به دریافت گزارشهای جدید از فلج برگشت ناپذیر ناشی از تزریق آمپولهای دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام، توجه کلیه همکاران محترم را به موارد زیر در ارتباط با تجویز و مصرف آمپول دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام جلب می نمایم:

- ۱- از تجویز آمپول دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام در کودکان زیر ۱۵ سال جداً خودداری فرمایید.
- ۲- جهت رفع درد در مواردی که تجویز کپسول، قرص و یا شیاف (کپسول ۱۰ میلی گرمی پیروکسیکام، قرص ۲۵ میلی گرم دیکلوفناک و شیاف های ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی دیکلوفناک) امکان پذیر است، جداً از تجویز آمپول های پیروکسیکام و دیکلوفناک بپرهیزید.
- ۳- از تزریق وریدی آمپولهای دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام جداً خودداری فرمایید.
- ۴- تزریق عضلانی آمپول دیکلوفناک سدیم باید به میزان ۷۵ میلی گرم در روز (در موارد شدید ۷۵ میلی گرمی دو بار در روز) حداکثر به مدت ۲ روز تجویز گردد.
- ۵- به منظور پیشگیری از آسیب های بافتی در محل تزریق، آمپول دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام باید به صورت عمیق در عضله گلوئیتال تزریق شوند.
- ۶- در درمان تب یا رفع علائم سرماخوردگی جداً از تجویز آمپول دیکلوفناک سدیم یا پیروکسیکام بپرهیزید.
- ۷- موارد مصرف آمپول دیکلوفناک سدیم شامل دردهای پس از عمل جراحی و شرایط حاد درد و التهاب و Ureteric colic می باشد.
- ۸- موارد مصرف آمپول پیروکسیکام شامل درمان اولیه شرایط حاد درد و التهاب در بیماریهای روماتوئید و سایر اختلالات عضلانی- اسکلتی و نقرس حاد می باشد.
- ۹- در صورت مشاهده هرگونه عارضه با این دو فرآورده نام شرکت سازنده، شماره سری ساخت (شماره بچ یا Batch NO. یا Lot NO.) و تاریخ انقضاء فرآورده را به خاطر بسپارید. خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب تزریق عضلانی آمپول دیکلوفناک سدیم و یا پیروکسیکام فرم مخصوص گزارش عوارض داروها را تکمیل نموده، به آدرس تهران صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۸۵ ارسال نمایید و یا با شماره تلفن ۶۴۰۵۵۶۹ تماس حاصل فرمایید. هنگام گزارش حتماً نام شرکت سازنده، شماره سری ساخت و تاریخ انقضاء فرآورده را مرقوم فرمایید. لازم به یادآوری می باشد در صورتی که درد بیمار شدید و مزمن باشد می توان از مخدرهای تزریقی استفاده نمود. همینطور به خاطر بسپارید که شیاف دیکلوفناک از نظر فارماکوکینتیکی و غلظت سرمی دارو جایگزین بسیار مناسبی برای دیکلوفناک تزریقی می باشد. به همکاران عزیز توصیه می شود حتی المقدور جهت پیشگیری از مشکلات یاد شده، در هر نسخه بیش از ۲ عدد آمپول تزریق دیکلوفناک و یا پیروکسیکام تجویز نگردد.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

دفتر تحقیق و توسعه - معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی