

هشدار

در مورد شکل تزریقی پیروکسیکام

پیروکسیکام یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی است که فقط در اختلالات مفصلی و اسکلتی - عضلانی، نظیر اسپوندیلیت آنکیلوزان، استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید و نقرس حاد مورد مصرف دارد.

از آنجایی که شکل تزریقی این دارو به تازگی وارد بازار دارویی ایران شده است با توجه به عوارض ناخواسته ناشی از آمپول دیکلوفناک، به منظور کاهش عوارض ناخواسته ناشی از فرم تزریقی پیروکسیکام، لازم است نکات زیر را به اطلاع همکاران محترم برسانیم:

۱- بطور کلی تزریق این دارو در کودکان در هیچ شرایطی مورد تایید قرار نگرفته است.

۲- تجویز فرم تزریقی پیروکسیکام به منظور کاهش تب به خصوص در کودکان به هیچ عنوان توصیه نشده است.

۳- درد و گاهی آسیب بافتی در محل تزریق از عوارض تزریق عضلانی این دارو می باشد.

۴- پارستزی به دنبال تزریق عضلانی این دارو گزارش شده است.

۵- در حدود ۳۰٪ افرادی که روزانه ۲۰ میلی گرم پیروکسیکام (خوراکی - تزریقی) دریافت می دارند، دچار عوارض ناخواسته سیستمیک این دارو می گردند که عمدتاً به صورت عوارض گوارشی است.

۶- ایمنی و اثر بخشی فرم خوراکی پیروکسیکام به منظور درمان علامتی آرتریت جوانی در کودکان مورد تایید قرار نگرفته است.

۷- مصرف این دارو ممکن است بعضی از علائم بروز عفونت (افزایش درجه حرارت بدن) را در بیمار مخفی نگاهدارد.

۸- به منظور کاهش تخریب بافتی در محل تزریق توصیه می شود به صورت عمیق در عضله سرینی تزریق گردد.

۹- آمپول پیروکسیکام نیز به همان میزان دیکلوفناک تزریقی می تواند عوارض ناخواسته ایجاد نماید.

خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه عارضه، فرم مخصوص ثبت و بررسی عوارض داروها را تکمیل نموده و به آدرس تهران- صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۸۵ ارسال نموده و یا با شماره تلفن ۶۴۰۵۵۶۹ تماس حاصل فرمایید.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذایی و دارویی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی