

”تشدید و توسعه عوارض تزریق ترامادول ۱۰۰ میلی گرمی”

پیرو اطلاعیه شماره ۲۸ مرکز ADR مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۲، ضمن تشکر از همکاری جامعه محترم پزشکی در ارسال گزارشهای مربوط به عوارض دارویی ناشی از مصرف ترامادول، به اطلاع کلیه همکاران محترم می‌رساند که از تیر ماه ۱۳۸۱ الی پایان مهر ۱۳۸۲ تعداد ۱۶۲ مورد گزارش عارضه دارویی مربوط به ترامادول از ۴۹ شهرستان مختلف به مرکز ADR ایران ارسال شده است. سوزش سینه، تنگی نفس شدید، هیپوتانسیون و حتی مرگ در اثر تزریق در مجموعه گزارشات دیده می‌شود (اگرچه ارتباط موارد مرگ گزارش شده با مصرف ترامادول به اثبات نرسیده است). این عوارض در هر دو نوع داروهای خارجی و تولید داخل به یک میزان گزارش شده است. با توجه به افزایش بی‌رویه مصرف این فرآورده در کشور، از همکاران محترم درخواست می‌شود به نکات زیر توجه فرمایند:

- ۱- از تجویز شکل تزریقی ترامادول برای دردهای خفیف تا متوسط (مانند سردرد های معمولی، دردهای عضلانی، سرماخوردگی و موارد مشابه آن) که با داروهای ضد درد خوراکی (از جمله شکل خوراکی ترامادول) و یا شیاف‌ها قابل درمان هستند، مؤکدا خودداری فرمایید.
- ۲- در بیمارانی که این دارو را به طور تزریقی دریافت می‌کنند، احتمال بروز دپرسیون تنفسی وجود دارد.
- ۳- ایمنی و اثر بخشی مصرف ترامادول در کودکان زیر ۱۶ سال ثابت نشده است و مصرف آن در این گروه سنی توصیه نمی‌گردد.
- ۴- واکنشهای آنافیلاکتیک کشنده و سایر واکنشهای ازدیاد حساسیت مانند خارش، کهیر، برونکواسپاسم و آنژیوادم ممکن است بروز نماید. در بیماران با سابقه حساسیت به کدئین و سایر اپیوئیدها مصرف این دارو توصیه نمی‌شود.
- ۵- مقدار مصرف ترامادول (در هر دوز مصرفی و در طول هفته) باید به حداقل ممکن کاهش یابد. از همکاران محترم تقاضا می‌گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف این دارو با مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (شماره تلفن: ۶۴۰۴۲۲۳) تماس حاصل فرمایند.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

دفتر تحقیق و توسعه-معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

