داروهایی که در افراد مبتلا به فاویسم منع مصرف دارد

نام دارو(فارسی)	نام دارو (انگلیسی)	شدت خطر	دسته دارویی
نیتروفورانتوئین	Nitrofurantoin	بسیار بالا	آنتی بیوتیک‌ها
نیتروفورازون	Nitrofurazon		
سیپروفلوکساسین	Ciprofloxacin		
موکسی‌فلوکساسین	Moxifloxacin		
نالیدیکسیک اسید	Nalidixic Acid		
نوروفلوکساسین	Norfloxacin		
افلوکساسین	Ofloxacin		
کلرامفنیکل	Chloramphenicol		
کوتریموکسازول	Co-Trimoxazole		
سولفاستامید	Sulfacetamide		
سولفادیازین	Sulfadiazine		
سولفامتوکسازول	Sulfamethoxazole		
سولفاپیریدین	Sulfapyridine		
سولفاسالازین	Sulfasalazine		
سولفی‌زوکسازول	Sulfisoxazole		
فورازولیدین	Furazolidone	بالا	آنتی بیوتیک
سولفاگوانیدین	Sulfaguanidine		
سولفامرازین	Sulfamerazine		
گلی بن‌کلامید	Glibenclamid	بالا	ضد دیابت
دی مرکاپرول	Dimercaprol(BAL)	بالا	آنتی‌دوت
تری‌هگزیفنیدیل	Trihexyphenidyl	بالا	ضدپارکینسون
لاموتریژین	Lamotrigine	بالا	ضدافسردگی
آنتازولین	Antazoline	بالا	آنتی-هیستامین
فنی‌توئین	Phenytoin	پایین	ضدصرع
استامینوفن	Paracetamol	پایین	ضددرد
استرپتومایسین	Streptomycin	پایین	ضد میکروب
ایزونیازید	Isoniazid		

نام دارو(فارسی)	نام دارو (انگلیسی)	شدت خطر	دسته دارویی
میاکرین	Mepacrine	بسیار بالا	ضد مالاریا
کلروکین	Chlorquine		
پنتاکین	Pentaquine		
پریماکین	Primaquine		
متیلن بلو	Methylene Blue		
نیریدازول	Niridazole	بسیار بالا	ضدکرم
دوکسوروبیسین	Doxorubicine	بسیار بالا	ضدسرطان
داپسون	Dapsone	بسیار بالا	ضد میکروب
الدسولفون(سیفوکسون)	Aldesulfone Na		
تیازوسولفون	Thiazosulfone		
پاراآمینو سالیسیلیک اسید	P-Amino Salicyclic Acid		
فنازوپیریدین	Phenazopyridine	بسیار بالا	ضد درد و التهاب
آسپرین	Aspirin	بسیار بالا	ضد درد و التهاب
استانیلید	Acetanilide		
فنیل بوتازون	Phenylbutazone		
پروبنسید	Probencide		
مزالازین	Mesalazine		
هیدرالازین	Hydralazine	بالا	قلبی عروقی
متیل دوپا	Methyldopa		
دوپامین	Dopamine		
پروکایین‌آمید	Procainamid		
کینیدین	Quinidine		
ویتامین K_1	Vit K	پایین	ویتامین
ویتامین C	Vit C		
دیفن هیدرامین	Diphenhydramine	پایین	آنتی-هیستامین
کلشی‌سین	Colchicin	پایین	ضدنقرس

خوراکی‌های ممنوعه: انواع باقلا، لوبیای سویا، نخود فرنگی، مواد غذایی حاوی سویا، بادام زمینی، جوانه‌ها، چای سبز، چای سیاه، عرق یا عصاره شیرین بیان،مواد غذایی حاوی منتول، مقادیر زیاد ویتامین C، مصرف رنگهای مصنوعی خوراکی، آب میوه و ترشی‌های حاوی سولفیت، مکمل‌های حاوی آهن، کنسرو ها و مواد فراوری شده حاوی سویا